

LaTeX-cursus Week 2 (slides: versie Vincent)

TeXniCie

3 oktober 2022

Slides zijn te vinden op
texnicie.nl

Agenda

- ▶ Document & referenties
- ▶ 'Theorem' en 'Lemma'
- ▶ ⟨Oefeningen!⟩
- ▶ Figuren
- ▶ Matrices en tabellen
- ▶ ⟨Oefeningen!⟩
- ▶ AAA

Pagina marges


```
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[a4paper,margin=2.54cm]{geometry}
```

```
\title{My document}
\author{Vincent Kuhlmann}
\date{1 May 2021}
```

```
\begin{document}
\maketitle
\section{Introduction}
```

Hallo iedereen!

```
\end{document}
```



Inhoudsopgave

```
\usepackage[dutch]{babel}
...
\begin{document}
    \maketitle
    \tableofcontents
    \newpage

    \section{AA}

    ...
\end{document}
```

Inhoudsopgave

1	AA	2
2	BB	2
2.1	CC	2
2.1.1	DD	2
2.2	EE	2
3	FF	2
3.0.1	GG	2

Vincents favorite package: \usepackage[bookmarksnumbered]{hyperref}

69 (83 of 151)

and $a = a_1, \dots, a_n$ and $b = b_1, \dots, b_n$ tuples of elements of M and N , respectively. Write $\vec{a} \equiv_{\Gamma} \vec{b}$ if for every formula $\phi(x_1, \dots, x_n)$ from Γ we have:

$$M \models \phi(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow N \models \phi(b_1, \dots, b_n).$$

We shall apply this for Γ the set of quantifier-free L -formulas and for 1 simple L -formulas; in which case we write $\vec{a} \equiv_{\text{qf}} \vec{b}$, $\vec{a} \equiv_{\text{simple}} \vec{b}$, respect

Lemma 2.7.4 *Let L be an arbitrary language. Suppose that an L -theory T has the following property:*

Whenever M and N are models of T , and $\vec{a} = a_1, \dots, a_n$, $\vec{b} = b_1, \dots, b_n$ are tuples of elements of M and N , respectively, then $\vec{a} \equiv_{\text{qf}} \vec{b}$ implies $\vec{a} \equiv_{\text{simple}} \vec{b}$.

Then T has quantifier elimination.

Proof. Assume that T has the property in the statement of the Lemma 2.7.2 we have to show that every simple L -formula is T -equivalent to a quantifier-free formula in the same free variables. So, let $\exists v \phi(v, \bar{w})$ be a simple L -formula, with $\bar{w} = w_1, \dots, w_n$ the free variables. Let $\vec{c} = c_1, \dots, c_n$ be constants; we write $L_{\vec{c}}$ for $L \cup \{c_1, \dots, c_n\}$.

Let Γ be the set of all quantifier-free L -formulas $\psi(\bar{w})$ such that

$$T \models (\exists v \phi(v, \bar{w})) \rightarrow \psi(\bar{c})$$

Referenties

De oplossing van de differentiaalvergelijking $\frac{dv}{dt} = \cos^2(t)$ is

$$\begin{aligned} v(t) &= v_0 + \int_0^t \cos^2(t) dt \\ &= v_0 + \int_{t'=0}^{t'=t} \left(\frac{1}{2} \cos^2(t') + \frac{1}{2}(1 - \sin^2(t')) \right) dt' \\ &= v_0 + \frac{1}{2} \int_{t'=0}^{t'=t} (1 + \cos^2(t') - \sin^2(t')) dt' \\ &= v_0 + \frac{1}{2} \int_{t'=0}^{t'=t} (1 + \cos(2t')) dt' \\ &= v_0 + \frac{1}{4} \int_{2t'=0}^{2t'=2t} (1 + \cos(2t')) d(2t') \\ &= v_0 + \frac{1}{4} (2t + \sin(2t)) \\ &= v_0 + \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin(2t) \end{aligned}$$

De oplossing van de differentiaalvergelijking $\frac{dv}{dt} = \cos^2(t)$ is

$$v(t) = v_0 + \int_0^t \cos^2(t) dt. \quad (1)$$

De cosinus verdubbelingsformule is

$$\begin{aligned} \cos(2t) &= \cos^2(t) - \sin^2(t) \\ &= 2\cos^2(t) - 1. \end{aligned}$$

Beide leden integreren geeft

$$\frac{1}{2} \sin(2t) = \left(2 \int_0^t \cos^2(t') dt' \right) - t.$$

Hiermee vinden we (1) als

$$v(t) = v_0 + \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin(2t).$$

Referenties

De snelheid v is gedefinieerd als

$$\begin{aligned} v &:= \frac{dx}{dt} \\ \end{aligned}$$

De oplossing van de differentiaalvergelijking

$$\frac{dv}{dt} = \cos^2(t)$$

$$\begin{aligned} \begin{aligned} v(t) &= v_0 + \int_0^t \cos^2(t) dt \\ \end{aligned} \end{aligned}$$

`\label{eq:exprVelocity}`

`\end{aligned}`

...

Hiermee vinden we `(\ref{eq:exprVelocity})` als

$$\begin{aligned} \begin{aligned} v(t) &= v_0 + \frac{t^2}{2} \\ &+ \frac{1}{4}\sin(2t). \\ \end{aligned} \end{aligned}$$

`\end{aligned}`

De snelheid v is gedefinieerd als

$$v := \frac{dx}{dt} \quad (1)$$

De oplossing van de differentiaalvergelijking $\frac{dv}{dt} = \cos^2(t)$ is

$$v(t) = v_0 + \int_0^t \cos^2(t) dt. \quad (2)$$

De cosinus verdubbelingsformule is

$$\begin{aligned} \cos(2t) &= \cos^2(t) - \sin^2(t) \\ &= 2\cos^2(t) - 1. \end{aligned}$$

Beide leden integreren geeft

$$\frac{1}{2} \sin(2t) = \left(2 \int_0^t \cos^2(t') dt' \right) - t.$$

Hiermee vinden we (2) als

$$v(t) = v_0 + \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin(2t).$$

'Theorem' en 'Lemma': Gebruik

```
\usepackage{amsthm}
\newtheorem{theorem}{Stelling}
\newtheorem{lemma}[theorem]{Lemma}

...
\begin{lemma}
    Lorem ipsum dolor sit
    ...
    ... eget dolor.

    \begin{proof}
        Aenean massa. Cum
        ...
        ... quis enim.
    \end{proof}
\end{lemma}
```

Lemma 1.9. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.*

Proof. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. □

Oefeningen!

Vergeet niet de nodige packages toe te voegen.

Op mijn site staat een basisdocument met alle nodige packages erin:

vkuhlmann.com/latex/example

Figure

Hier zie je een pinguïn:

```
\begin{center}
    \includegraphics[height=2cm]{pinguin.jpg}
\end{center}
```

Foto door Sue Flood.

Hier zie je een pinguïn:



Foto door Sue Flood.

Figure

Een pinguïn zie je in Figuur~\ref{fig:pinguin}.

```
\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[height=2cm]{pinguin.jpg}
    \caption{Een schattige pinguïn.
Foto door Sue Flood.}
    \label{fig:pinguin}
\end{figure}
```

Een pinguïn zie je in Figuur 1.



Figuur 1: Een schattige pinguïn. Foto door Sue Flood.

Figuurplaatsing

\begin{figure}[t]



Figure 2: Voorbeeld van figuurplaatsing.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Zie hiervoor Figuur 2.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Do-

Figuurplaatsing

Specifieer een of meer van de onderstaande letters:

- ▶ h (HERE): Figuur mag hier.
- ▶ t (TOP): Figuur mag bovenaan een pagina.
- ▶ b (BOTTOM): Figuur mag onderaan een pagina.
- ▶ p (PAGE): Figuur mag op aparte pagina voor figuren.
- ▶ !: Override interne parameters voor floats.
- ▶ H (HERE): Geen floating, altijd hier. (`\usepackage{float}`)

Bijvoorbeeld: `\begin{figure}[ht]`

Wanneer je werkt met afbeeldingen: `\usepackage{graphicx}`

Dimensies

- Hele regelbreedte

```
\includegraphics[width=\linewidth]{assets/pinguin.jpg}
```

- 90% regelbreedte


```
\includegraphics[width=0.9\linewidth]{assets/pinguin.jpg}
```

- Maximaal 90% regelbreedte en maximaal 5 cm hoog

```
\includegraphics[  
    width=0.9\linewidth, height=5cm, keepaspectratio  
]{assets/pinguin.jpg}
```

Subfigure

```
\usepackage{subcaption}
...
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{...}
    \caption{BB}
    \label{fig:dphiExample}
  \end{subfigure}\quad
  \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{...}
    \caption{CC}
    \label{fig:fitExample}
  \end{subfigure}
  \caption{Meerdere afbeeldingen naast elkaar!}
\end{figure}
```



Figuur 1: Meerdere afbeeldingen naast elkaar!

Align

De verdubbelingsformule herschrijven we nu als

```
\begin{align*}
\cos(2\theta) &= \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) \\
&= 2\cos^2(\theta) - 1.
\end{align*}
```

De verdubbelingsformule herschrijven we nu als

$$\begin{aligned}\cos(2\theta) &= \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) \\ &= 2\cos^2(\theta) - 1.\end{aligned}$$

Matrices

```
\begin{align*}
R(\theta) = \begin{pmatrix}
\cos(\theta) & -\sin(\theta) \\
\sin(\theta) & \cos(\theta)
\end{pmatrix}
\end{align*}
```

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Matrices

```
\begin{align*}
R(\theta) &= \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \\
&= \left( \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \right)
\end{align*}
```

$$\begin{aligned}
R(\theta) &= \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \\
&= \left(\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \right)
\end{aligned}$$

Matrices

```
\begin{align*}
\abs{x} &= \left| \begin{matrix} \text{if } x \geq 0 \\ -x \text{ else} \end{matrix} \right|
\end{align*}

\begin{align*}
\abs{x} = \left| \begin{array}{rl} \text{if } x \geq 0 \\ -x \text{ else} \end{array} \right|
\end{align*}

\begin{align*}
\abs{x} = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{else} \end{cases}
\end{align*}
```

$$|x| = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{else} \end{cases}$$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{else} \end{cases}$$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{else} \end{cases}$$

Tabellen

With $n = 6$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$
$f(e) = \text{id}_A$	6			$\binom{6}{5} = 6$	
$f(r) = T = (012345)$	0			0	
$f(r^2) = T^2 =$	0			0	
$f(r^3) = T^3 =$	0			0	
$f(r^4) = T^4 =$	0			0	
$f(r^5) = T^5 =$	0			0	
$f(s) = S = (15)(24)$	2			2	
$f(sr) = ST =$	0			0	
$f(sr^2) = ST^2 =$	2			2	
$f(sr^3) = ST^3 =$	0			0	
$f(sr^4) = ST^4 =$	2			2	
$f(sr^5) = ST^5 =$	0			0	
Total	12	36	36	36	12
Number of orbits	1	3	3	3	2

Question (d). Prove that the amount of equivalence classes of elements of A with $k = 6$ and $n = 12$ equals 50.

With the same methodology as in Question (e) we can compute a table of $|A^g|$.

With $n = 12$, part 1	$k = 6$
id_A	
$T = (0,$	
$T^2 =$	
$T^3 = ($	
$T^4 = ($	
$T^5 = ($	
$T^6 = ($	
$T^7 = ($	
$T^8 = ($	
$T^9 = ($	
$T^{10} = ($	
$T^{11} = ($	

Tabellen

De resultaten:

```
\begin{tabular}{cc|l}
1 & 2 & 3 \\
400 & 500 & 600 \\
\hline
70 & 80 & 90
\end{tabular}
```

	1	2	3
De resultaten:	400	500	600
	70	80	90

Zie Tabel `\ref{tbl:nummers}` voor de resultaten.

```
\begin{table}[htbp]
\begin{tabular}{cc|l}
...
\end{tabular}
\caption{Interessante nummers}
\label{tbl:nummers}
\end{table}
```

Zie Tabel 1 voor de resultaten.

	1	2	3
De resultaten:	400	500	600
	70	80	90

Tabel 1: Interessante nummers

Tabellen

```
\usepackage{booktabs}
...
\begin{table}[htbp]
\centering
\begin{tabular}{c c p{2cm}}
\toprule
Getal 1 & Getal 2 & Notitie \\
\cmidrule(lr){1-2}\cmidrule(lr){3-3}
88 & 94 & Twee grote getallen \\
89 & 12 & Een grote en een kleintje \\
96 & 18 & Weer zo \\
\midrule
\multicolumn{2}{c}{527} & Totale som \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{Een tabel!}
\end{table}
```

Getal 1	Getal 2	Notitie
88	94	Twee grote getallen
89	12	Een grote en een kleintje
96	18	Weer zo
527		Totale som

Tabel 2: Een tabel!

Tabellen

```
\usepackage{booktabs}
```

...

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\begin{tabular}{ll}
\toprule
Formule & Beschrijving \\
\$ \sqrt{2} \$ & Wortel \\
\$ \frac{2}{3} \$ & Breuk \\
\$ 6 \geq 3 \$ & Symbool \\
\$ a^2 + b^2 \$ & Superscript \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{Een tabel!}
\end{table}
```

Formule	Beschrijving
$\sqrt{2}$	Wortel
$\frac{2}{3}$	Breuk
$6 \geq 3$	Symbool
$a^2 + b^2$	Superscript

Tabel 3: Een tabel!

Tabellen

```
\usepackage{booktabs}
\usepackage{tabularx}
...
\begin{table}[htbp]
\centering
\begin{tabularx}{\textwidth}{XX}
\toprule
Formule & Beschrijving\\
\midrule
$ \sqrt{2} $ & Wortel \\
$ \frac{2}{3} $ & Breuk \\
$ 6 \geq 3 $ & Symbool \\
$ a^2 + b^2 $ & Superscript \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\caption{Een tabel!}
\end{table}
```

Formule	Beschrijving
$\sqrt{2}$	Wortel
$\frac{2}{3}$	Breuk
$6 \geq 3$	Symbool
$a^2 + b^2$	Superscript

Tabel 4: Een tabel!

Oefeningen!

Vergeet niet de nodige packages toe te voegen.

Op mijn site staat een basisdocument met alle nodige packages erin¹:

vkuhlmann.com/latex/example

¹Enkel booktabs staat er niet in, want tabellen gebruik je niet standaard in je inleveropgaves.

Licentie

Contributors

Copyright (c) 2021–2022 Vincent Kuhlmann

Copyright (c) 2022 Tim Weijers

Copyright (c) 2022 Hanneke Schroten

Copyright (c) 2022 Thomas van Maaren

De TeXniCie licenseert deze PDF aan het publiek onder
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Als je slide-inhoud in een andere presentatie wil gebruiken, moet je de TeXniCie eerst om een andere licentie vragen.